

Assinale, com um X dentro dos parênteses, a resposta certa.

90. Qual o indicador empregado no doseamento do brometo de potássio?
- () goma de amilo
 - () fenolftaleína
 - () sol. de alume férrico-amonical
 - () sol. de cromato de potássio
91. O processo indicado pela Farmacopéia Brasileira para o doseamento do sulfato de zinco é:
- () volumétrico
 - () gravimétrico
 - () gasométrico
92. O óxido de zinco é solúvel:
- () na água
 - () no álcool
 - () nos ácidos minerais
 - () no clorofórmio
93. O aristol é um composto de:
- () cloro
 - () bromo
 - () iodo
 - () fluor
94. A Digitalis purpúrea contém:
- () alcalóides
 - () glicosídeos
 - () glucídeos
95. A que família botânica pertence a Quassia amara?
- () Rubiácea
 - () Rutácea
 - () Escrofulariácea
 - () Liliácea
 - () Simarubácea
96. Qual a parte da salsaparrilha usada como droga?
- () raiz
 - () folhas
 - () flor
 - () fruto
 - () casca
 - () lenho
97. O ensaio de Grahe serve para distinguir:
- () falsas ipecas de ipecas verdadeiras
 - () falsas beladonas de beladonas verdadeiras
 - () falsas quinas de quinas verdadeiras
98. O reagente de "Schiff" é empregado na caracterização de:
- () acetona
 - () álcool
 - () aldeído
 - () ácido
 - () fenol
99. Que reação apresentam os amino-ácidos em solução aquosa?
- () ácida
 - () básica
 - () neutra
 - () anfotera
100. Assinalar o glucídio redutor:
- () amilo
 - () sacarose
 - () glucose

Questões Apresentadas na P.H. 2073-Prova de Habilitação para Dentista de qualquer Ministério

Apresentamos as questões que fizeram parte da Prova Escrita da Prova de Habilitação para a Série Funcional de Dentista de Qualquer Ministério.

PROVA ESCRITA

Questões de múltipla escolha

Cada questão que segue consiste numa afirmação ou numa exposição que se completa quando for juntada uma das cinco linhas abaixo da aludida afirmação ou explicação.

O trabalho consiste em ler com atenção a primeira parte da questão e escolher uma das cinco linhas.

Exemplo: Questão: Entre os seguintes metais, o mais usado em Odontologia é:

- zircônio
- berilo
- ouro
- chumbo
- vanádio

Eis o exemplo. Lendo as cinco respostas, vê-se logo que a única aceitável é a resposta "ouro". Então, antes da palavra ouro coloque um sinal X.

Assim:

- zircônio
- berilo

X

- ouro

- chumbo
- vanádio

NOTA — Esta parte da prova contém 50 questões e vale até 50 pontos.

1. O anestésico empregado em Odontologia para anestesia troncular contém um vaso-constritor para:
 - combater o efeito da substância anestésica sobre o coração
 - diminuir a hemorragia no campo operatório
 - evitar dores pós-operatórias
 - protelar a difusão do anestésico injetado
 - aproveitar o efeito bacteriostático do anestésico
2. O que determina a maior dureza dos Raios X é:
 - intensidade da corrente
 - miliamperagem
 - resistência da ampola
 - o número de Watts consumidos
 - tensão da corrente
3. Os tecidos da boca toleram melhor:
 - ligas de ouro
 - ligas de cromo-cobalto
 - ligas de platina
 - amálgama de cobre
 - resina acrílica
4. O emprego de verniz isolante antes da obturação com cimento de silicato tem como finalidade:
 - evitar a evaporação da água do silicato

- evitar a penetração de silicato nos canalículos dentinários
 - evitar a penetração de ácido nos canalículos dentinários
 - evitar a descalcificação da dentina
 - estabelecer adesividade da obturação
5. Dentre os fatores abaixo, qual o indispensável para que haja formação de tártaro dentário:
 - excesso de vitamina C
 - falta de vitamina C
 - excesso de ácido oxálico na saliva
 - presença de globulinas na saliva
 - presença de tiocianatos na saliva
 6. O endurecimento do alginato é um processo:
 - químico
 - térmico
 - de cristalização
 - mecânico
 - de dessecação
 7. Dentre os seguintes itens, assinale aquele que não é causa etiológica da pulpíte:
 - irritação química
 - invasão microbiana
 - irritação térmica
 - irritação traumática
 - hipersensibilidade dentinária
 8. A dose de segurança para os pacientes, em face dos Raios X, na prática do radiodiagnóstico dentário habitual é de:
 - 3600 miliampères-segundos
 - 600 " "
 - 90 " "
 - 30 " "
 - 15 " "
 9. A abrasão pode ocasionar:
 - paradentose
 - dentina secundária
 - pericementite
 - oclusão traumática
 - torsi-versão
 10. Um paciente portador de infecção focal dentária vem sendo tratado há dez dias com dois comprimidos de 0,5 grs. de sulfá, de quatro em quatro horas. Feita uma extração dentária, apresenta, vinte e quatro horas depois, os seguintes sinais: fraqueza, mal-estar, dor de garganta, com induto pultáceo e certo aumento dos gânglios linfáticos cervicais. Em qual das seguintes hipóteses urge pensar:
 - bacteremia por manipulação de foco
 - ativação de foco e propagação à garganta
 - simples resfriado
 - granulopenia por intoxicação
 - metástase de neoplasma
 11. Assinale, dentre as seguintes, a que não é indicação para extração:
 - dentes inclusos em portador de dentadura
 - dentes com destruição de mais de dois terços do paradêncio
 - dentes com abscessos crônicos
 - dentes implantados em área de ósteo-necrose
 - dentes com tubérculo de Carabelli
 12. Assinale o que ocorre quando as dentaduras de resina acrílica são guardadas fora d'água:
 - mudam de cor
 - modificam o tamanho
 - soltam os dentes
 - ficam gretadas
 - ficam porosas
 13. Em caso de excesso de salivagem emprega-se:
 - urotropina
 - cilotropina
 - atropina
 - pilocarpina
 - adrenalina
 14. Em qual dos seguintes estados pode ocorrer a necrose da papila gengival:
 - estomatite aftosa
 - estomatite cremosa
 - paradentose
 - estomatite gravídica
 - estomatite mercurial
 15. A pequena marca em relevo que os filmes dentários apresentam serve para:
 - prender o grampo para revelar
 - diferenciar o filme, na câmara escura, do restante invólucro
 - distinguir, em qualquer filme, o lado da emulsão sensível
 - servir como ponto de referência para localização da área radiografada
 - indicar o grau de sensibilidade do filme
 16. Qual dos seguintes estados mórbidos ou condições patológicas representa maior perigo de contágio para o cirurgião dentista:
 - placas mucosas
 - épulis
 - queilite
 - xerostomia
 - goma sifilítica
 17. O aumento da inclinação das cavidades glenóides da articulação têmporo-mandibular, ocasiona:
 - aumento do raio da curva de Spee
 - diminuição do raio da curva de Spee
 - aumento da inclinação das cúspides dentárias
 - aumento do over-bite
 - diminuição da dimensão vertical
 18. As hipoplasias do esmalte em dentes decíduos são encontradas mais freqüentemente:
 - nas superfícies vestibulares dos incisivos superiores
 - na coroa dos caninos
 - nas superfícies oclusais dos molares
 - nos pontos de contato dos incisivos
 - nos pontos de contato dos molares
 19. Numa radiografia, a imagem mais radiotransparente é:
 - do esmalte
 - da dentina
 - da polpa
 - do cimento
 - do osso alveolar
 20. As impressões em alginato devem ser passadas para gesso imediatamente após a remoção da bôca, para:
 - evitar contração do material
 - evitar distorção do modelo
 - evitar a proliferação de germes
 - evitar a formação de fendas ou gretas
 - evitar a decomposição do material
 21. Dentre as condições abaixo, qual não dificulta a extração dentária:
 - dente com cisto radicular
 - dente com dentina friável
 - dente com anquilose
 - dente com raízes divergentes
 - dente com exostose
 22. Placas fibrinosas, esbranquiçadas, facilmente removíveis, situadas nos pilares da garganta, úvula e parede da faringe, são características de:
 - leucoplasia
 - difteria
 - noma
 - monilíase
 - tuberculose
 23. Na moldagem indireta para incrustações, o material que dá maior exatidão é:
 - cêra
 - gesso
 - godiva
 - hidrocolóide
 - composição de Dietrich
 24. O traçado do arco gótico serve para determinar:
 - inclinação das cavidades glenóides
 - relação cêntrica

- dimensão vertical
 - over-bite
 - curva de compensação
25. A presença de grande número de lactobacilos acidófilos na saliva, pode representar:
- bloqueio do sistema retículo-endotelial
 - falta de anticorpos
 - predisposição à cárie
 - predisposição à estomatite aftosa
 - predisposição à paradentose
26. O chamado "risso sardônico" faz pensar, de preferência, em:
- trismo infeccioso
 - trismo traumático
 - tétano
 - paralisia facial
 - meningite
27. Um molde em alginato mantido imerso em água:
- aumenta de volume
 - diminui de volume
 - retarda o endurecimento do gesso
 - aumenta o endurecimento do gesso
 - aumenta a expansão do gesso
28. Dentre os seguintes estados qual não ocasiona dor:
- pulpite
 - pericementite
 - perturbações circulatórias dos vasos pulpaes
 - neurite
 - degeneração gordurosa da polpa
29. Após quinze minutos, uma obturação a silicato atinge a
- 5%
 - 10%
 - 40%
 - 70%
 - 100%
- da resistência que atingirá catorze meses depois.
30. Em qual dos seguintes estados menos esperaríamos encontrar reação ganglionar cervico-facial:
- epiteloma da língua
 - cancro duro
 - doença de Hodgkin
 - abscesso dentário crônico
 - trismo decorrente de tétano
31. A abrasão dentária é:
- defeito congênito
 - conseqüente ao tártaro dentário
 - deficiência de vitamina
 - conseqüente à acidez da saliva
 - mero desgaste mecânico
32. Exclua uma das seguintes forças, que não seja aplicada na extração dentária:
- força de pressão
 - força lateral
 - força de torsão
 - força rotatória centrífuga
 - força de tração
33. Na redução de uma luxação têmporo-mandibular, os movimentos são:
- para baixo e para trás
 - para cima e para dentro
 - para fora e para cima
 - para cima e para frente
 - para baixo e para diante
34. Uma dose diária de fluoreto, útil na profilaxia da cárie e sem perigos, seria de:
- um micrograma
 - mil microgramas
 - vinte e cinco mil microgramas
 - um decigrama
 - uma grama
35. O amálgama com baixo teor de mercúrio, comparado com o de alto teor de mercúrio, vem a ser:
- mais fraco
 - mais forte
 - igualmente resistente
 - mais solúvel no meio bucal
 - menos solúvel no meio bucal
36. Qual dos seguintes elementos anatômicos não pode ser confundido com um cisto, na interpretação radiográfica:
- buraco palatino anterior
 - fossa nasal
 - divertículos de seio maxilar
 - alvéolo de extração dentária recente
 - buraco mentoniano
37. Noma é:
- infecção sifilítica
 - neoplasma maligno
 - lesão de fundo tuberculoso
 - processo gangrenoso
 - leucemia linfática
38. As manchas de Koplik têm relação com:
- sarampo
 - varicela
 - escarlatina
 - cachumba
 - período secundário da sífilis
39. Numa radiografia mostrando as superfícies proximais dos dentes, uma lesão por cárie mais facilmente se confundirá com:
- obturação a silicato
 - tártaro dentário
 - bolsa piorrética
 - dentina secundária
 - nódulo pulpar
40. Gengivas tumefeitas, túrgidas a ponto de cobrir os dentes, sensíveis e sangrando ao mais leve toque, de coloração vermelho-violácea e mesmo equimótica, associadas à fetidez do hálito e sensibilidade dolorosa dos ossos, faz pensar em:
- deficiência de vitamina C
 - gengivite hipertrófica pelo Dilantin Sódico
 - gengivite arsenical
 - gengivite gravídica
 - gengivite traumática
41. A dentina secundária é formada por:
- fibras do paradênciao
 - odontoclastos
 - odontoblastos
 - restos epiteliais de Malassez
 - cementoblastos
42. O hidróxido de cálcio é empregado modernamente como:
- pó dentifrício
 - capeador da polpa
 - obturador de canal
 - obturação provisória
 - hemostático tópico
43. Uma concavidade atingindo a dentina na face vestibular de um incisivo central superior, com superfície polida, de fundo duro e bordos lisos, é:
- erosão
 - cárie
 - abrasão
 - cavidade deixada pela queda de obturação
 - mancha de Koplik
44. O ácido para-amino-benzóico e seus derivados tem ação:
- solubilizante das sulfanilamidas
 - sinérgica das sulfanilamidas
 - impediante das sulfanilamidas
 - corretivo das sulfanilamidas
 - fixador das sulfanilamidas
45. Para qual dos seguintes tumores deve o cirurgião dentista estar mais atento, diante de alteração da ponta da língua:
- épulis
 - rânula
 - leio-mioma
 - epiteloma espino-celular
 - sarcoma
46. O emprêgo de barbitúrico antes da anestesia ocasiona:
- propensão à hemorragia
 - maior resistência à infecção

- vaso-constricção local
- facilidade de formação do coágulo
- potencialização da anestesia
- 47. Na dentadura decídua, a curva de Spee
 - é inexistente
 - tem metade do raio daquela da dentição permanente
 - tem um terço do raio daquela da dentição permanente
 - tem dois terços do raio daquela da dentição de leite
 - é igual à da dentadura permanente
- 48. Assinale, dentre os seguintes itens, aquele que não influi na escolha dos primeiros molares permanentes como chave de oclusão:
 - são os dentes em torno dos quais irrompem os demais dentes permanentes
 - são os dentes maiores e mais fortes
 - são favoravelmente colocados para o esforço oclusal
 - atuam na separação das arcadas
 - são os dentes de raízes mais compridas
- 49. Assinale, dentre os seguintes itens, aquele menos comprometido pela respiração bucal:
 - força de plano inclinado
 - pressão muscular
 - pressão atmosférica
 - pneumatização dos seios
 - força de contato proximal
- 50. Dentre as seguintes causas de fracasso no tratamento da paradentose, assinale a menos verdadeira:
 - tentativa de tratamento de dentes condenados
 - técnica deficiente e falta de continuidade
 - imprecisão no diagnóstico
 - omissão da radioterapia
 - falta de cooperação do paciente.

QUESTÕES ALTERNATIVAS

Cada uma das seguintes questões contém uma afirmativa. Esta pode parecer-lhe aceitável, verdadeira, exata ou correta.

Se assim fôr, faça um sinal X antes da palavra "certo".

Se, inversamente, a afirmação contida na questão lhe parecer inaceitável, falsa, errada, incorreta, ou impossível, ponha um sinal X antes da linha onde diz "errado".

Se deixar uma questão em branco, será interpretado que o candidato concordou com a afirmação contida na questão.

NOTA — O número de pontos que poderá ganhar nesta segunda parte da prova vai de zero a cinquenta.

1. A estabilidade de côr de uma liga de ouro no meio bucal é tanto maior quanto mais dura a liga.
 - certo
 - errado
2. Numa radiografia, uma obturação cervical pequena, de cimento de silicato, forrada com óxido de zinco e eugenol pode ser confundida com nódulo pulpar.
 - certo
 - errado
3. Na hiperemia pulpar o limiar de excitação elétrica é abaixo de normal.
 - certo
 - errado
4. Para se colocar uma coroa metálica deve-se proceder à pulpectomia a fim de evitar degeneração da polpa por choques térmicos.
 - certo
 - errado
5. A simples manipulação de um canal infetado pode provocar bacteremia.
 - certo
 - errado
6. A excessiva formação de cimento nas raízes dentárias é chamada cementoma.
 - certo
 - errado
7. No diabético é contra-indicada a anestesia troncular.
 - certo
 - errado
8. Numa radiografia, a apófise coronóide pode ser interpretada como um dente incluso.
 - certo
 - errado
9. Deve-se aproveitar o estado de choque para fazer a redução e contensão das fraturas.
 - certo
 - errado
10. A anestesia regional na criança é contra-indicada pela impossibilidade de localização dos pontos de referência.
 - certo
 - errado
11. O teor de cálcio e fósforo contidos na saliva protege os dentes contra a cárie dentária.
 - certo
 - errado
12. A intoxicação crônica pelo mercúrio pode acarretar a perda de dentes.
 - certo
 - errado
13. Denomina-se complexa a cavidade por cárie em que há comprometimento concomitante do esmalte, dentina e polpa.
 - certo
 - errado
14. O pó e o líquido dos cimentos de silicato não são afetados pelos vapores dos óleos essenciais.
 - certo
 - errado
15. Uma restauração metálica próxima a uma obturação a cimento de silicato, estando a saliva em fase de acidez, é capaz de gerar corrente elétrica.
 - certo
 - errado
16. A novocaína é duas vezes e meia mais tóxica do que a cocaína.
 - certo
 - errado
17. A cultura negativa com material do canal radicular não prova sua esterilidade.
 - certo
 - errado
18. A doença cardíaca não acarreta maior predisposição para a hemorragia.
 - certo
 - errado
19. A mucosa da boca tolera melhor a vulcanite rosa do que a resina acrílica.
 - certo
 - errado
20. Os cistos dentários são mais freqüentes nos pacientes com reação de Wassermann positiva.
 - certo
 - errado
21. Os cimentos de silicato são menos solúveis no meio bucal que os cimentos de oxifosfato.
 - certo
 - errado
22. O tártaro dentário só se forma na superfície dos dentes naturais.
 - certo
 - errado
23. Na anestesia infra-orbitária, por via oral, a agulha deve ser introduzida no canal infra-orbitário.
 - certo
 - errado
24. O sulfato de potássio a 2% acelera o endurecimento do gesso.
 - certo
 - errado

25. Para haver pulpíte há necessidade de exposição pulpar.
— certo
— errado
26. A solução anestésica em meio ácido é melhor tolerada pelos tecidos do que em meio alcalino.
— certo
— errado
27. Os fluoretos ingeridos pelas mães durante o aleitamento são encontrados no leite.
— certo
— errado
28. Na hipercementose a membrana pericementária se mantém íntata.
— certo
— errado
29. Numa radiografia, a reabsorção alveolar senil pode ser interpretada como uma forma de paradentose.
— certo
— errado
30. As formas de paradentose horizontais respondem melhor ao tratamento do que as denominadas verticais.
— certo
— errado
31. A hemo-sedimentação constitui precioso índice para determinar a capacidade de coagulação do paciente que vai ser operado.
— certo
— errado
32. O cancro duro não é acompanhado de reação ganglionar.
— certo
— errado
33. A presença de umidade nas placas de manipulação acelera o endurecimento dos cimentos.
— certo
— errado
34. O cálcio administrado após a formação dos dentes não tem valor terapêutico na profilaxia da cárie.
— certo
— errado
35. Nos pacientes tuberculosos, o bacilo de Koch não é comumente encontrado nos abscessos dentários.
— certo
— errado
36. Nas dentaduras de resina acrílica existe sempre perda da estabilidade dimensional.
— certo
— errado
37. O processo mais exato para o diagnóstico do abscesso pulpar é a radiografia.
— certo
— errado
38. O uso de antibióticos não cria imunidade aos germes sensíveis.
— certo
— errado
39. O gesso quando endurece sofre uma contração.
— certo
— errado
40. O aumento da dimensão vertical acarreta diminuição da potência mastigatória.
— certo
— errado
41. Os fluoretos são substâncias tóxicas.
— certo
— errado
42. Nas obturações a cimento de silicato só se faz a bisel nas cavidades de colo.
— certo
— errado
43. Os antibióticos produzem mais anticorpos do que as vacinas.
— certo
— errado
44. A hipoplasia do esmalte ocorre após a erupção do dente.
— certo
— errado
45. As deformações decorrentes das mudanças térmicas na boca são maiores nas dentaduras de base metálica que nas dentaduras de resina.
— certo
— errado
46. O recozimento das ligas de ouro e cobre diminui o seu limite proporcional.
— certo
— errado
47. A dentadura de base metálica tem como grande inconveniente a sua boa condutibilidade térmica.
— certo
— errado
48. As cáries observadas durante a gravidez correm por conta de mobilização do cálcio dentário.
— certo
— errado
49. A respiração bucal se associa geralmente ao tipo de má oclusão da classe II Divisão I ou disto-oclusão.
— certo
— errado
50. As obturações nos dentes de criança são suscetíveis de cair com mais facilidade, em virtude do crescimento dos dentes.
— certo
— errado
51. O tratamento cirúrgico dos cistos só deve ser tentado depois de esgotados os demais processos.
— certo
— errado
52. Ácido acetil-salicílico é a mesma coisa que aspirina.
— certo
— errado
53. O óxido de zinco apresenta um eventual perigo de conter arsênico.
— certo
— errado
54. Eugenol é a mesma coisa que óleo de cravo.
— certo
— errado
55. Neuralgia é uma nevrite dos nervos periféricos.
— certo
— errado
56. As obturações a cimento de silicato são contra-indicadas nos dentes anteriores dos respiradores bucais.
— certo
— errado
57. A angina de Ludwig é uma doença do soalho da boca.
— certo
— errado
58. Na pulpíte habitualmente há gânglios linfáticos palpáveis e sensíveis.
— certo
— errado
59. Nos molares inferiores, o corno pulpar mais suscetível de exposição durante o preparo de cavidade é o méso-lingual.
— certo
— errado
60. Parede axial de uma cavidade é aquela que forma o teto da câmara pulpar.
— certo
— errado
61. Durante a rizólise dos dentes decíduos, a câmara pulpar diminui de volume.
— certo
— errado
62. As inclusões dos caninos mandibulares ocorrem menos frequentemente que as inclusões dos caninos superiores.
— certo
— errado

63. O Tricresol-formol é mais irritante que o Para-mono-clorofenol canforado na terapêutica dos canais radiculares.
— certo
— errado
64. Numa dentadura com dimensão vertical muito diminuída a cabeça do côndilo fica forçada muito para trás.
— certo
— errado
65. Um foco de infecção que se mantém após a extração de um dente é uma infecção focal.
— certo
— errado
66. Os dentes decíduos extranumerários não são frequentes.
— certo
— errado
67. Uma inflamação pode produzir uma hiperplasia do osso.
— certo
— errado
68. A operação de Caldwell-Luc é executada para a remoção do terceiro molar superior incluso.
— certo
— errado
69. A má-oclusão nunca ocorre na dentição decídua.
— certo
— errado
70. A presença de número e relação adequados de dentes são fatores necessários para o crescimento normal dos maxilares.
— certo
— errado
71. O tipo de má-oclusão decorrente da sucção do polegar geralmente é a classe III.
— certo
— errado
72. As coroas de jaqueta sem ombro são particularmente indicadas nos incisivos inferiores.
— certo
— errado
73. Nos casos de mordida baixa as coroas de resina acrílica são mais indicadas que as de porcelana fundida.
— certo
— errado
74. Durante o endurecimento, o amálgama de cobre expande mais que o de prata.
— certo
— errado
75. E' um requisito mecânico assencial nas dentaduras parciais (aparelhos tipo Roach) serem rijas as barras palatina e lingual.
— certo
— errado
76. A hiperfunção da hipófise pode ocasionar má-oclusão, mesmo após a erupção dos dentes permanentes e completo desenvolvimento orgânico.
— certo
— errado
77. O estrangulamento pulpar pode decorrer do simples uso de um separador de dentes.
— certo
— errado
78. Uma coroa dentária pode sofrer fratura sem que daí resulte qualquer exposição de dentina.
— certo
— errado
79. E' uma finalidade precípua da odontologia preventiva surpreender as cáries incipientes.
— certo
— errado
80. A vitamina K tem relação com a formação da protrombina.
— certo
— errado
81. A tintura de iodo envelhecida contém ácido iodídrico.
— certo
— errado
82. O trioximetileno é polímero do formol.
— certo
— errado
83. O ácido nicotínico produz indutos dentários escuros.
— certo
— errado
84. Nas dentaduras artificiais os dentes de resina provocam menos reabsorção da estrutura óssea que os de porcelana.
— certo
— errado
85. A reabsorção de raiz só pode ocorrer nos dentes decíduos.
— certo
— errado
86. O torus palatinus é um tumor maligno da abóbada palatina.
— certo
— errado
87. Granuloma não é neoplasma.
— certo
— errado
88. O torus mandibularis só ocorre na face lingual da mandíbula.
— certo
— errado
89. A via de escoamento do pus dos abscessos dentários segue sempre a força da gravidade.
— certo
— errado
90. A iontoforese dissocia electroliticamente os compostos medicamentosos empregados.
— certo
— errado
91. O cisto radicular pode ocorrer em dente de polpa hígida.
— certo
— errado
92. A irradiação ultravioleta como fator na produção de vitaminas só está demonstrada com relação à vitamina D.
— certo
— errado
93. Em caso de trismo é impossível fazer a anestesia por infiltração de nervo dentário inferior.
— certo
— errado
94. A associação da cânfora ao fenol tem por fim aumentar sua ação antisséptica.
— certo
— errado
95. Uma das vantagens da resina acrílica é a de não haver possibilidade de causar reações alérgicas.
— certo
— errado
96. Os dentes com dentina opalescente são mais resistentes à cárie.
— certo
— errado
97. Os dentes com inclinação demasiada não são aconselhados para pilar de pontes fixas.
— certo
— errado
98. O movimento ortodôntico pode acarretar reabsorção da raiz.
— certo
— errado
99. A paradentose não é uma infecção específica.
— certo
— errado
100. A halitose é um sinal patognomônico da paradentose.
— certo
— errado